



Encuesta
Social
Covid-19



Resultados:
Salud

2da Ronda ESC-19




Encuesta
Social
Covid-19

1. Efecto de la pandemia en los hogares en torno a salud

Hogares que han debido alterar actividades o gastos relacionados al cuidado de la salud desde el inicio de la crisis


Porcentaje, hogares



Nota: Al 95% de confianza, se encuentran diferencias significativas al comparar entre todas las categorías, excepto al comparar “Reducir los gastos en medicamentos” con “Suspender, postergar o reducir otros tratamientos de salud” y al comparar “Suspender, postergar o reducir otros tratamientos de salud” con “Suspender o postergar cirugías”

Hogares que declaran que uno de sus integrantes tuvo que suspender o postergar consultas médicas, dentales u otras, desde el inicio de la crisis


Porcentaje, hogares



Nota: Al 95% de confianza, se encuentran diferencias significativas al comparar por el sexo de la jefatura del hogar. Al comparar entre quintiles de ingreso se encuentran diferencias significativas, al 95% de confianza, entre Q1 y Q4; Q1 y Q5; Q2 y Q4; Q2 y Q5; Q3 y Q4; y Q3 y Q5. Al comparar los hogares según presencia de NNA, NO se encuentran diferencias al 95% de confianza. Al comparar los hogares según presencia de personas de 60 años o más, se encuentran diferencias al 95% de confianza.

Hogares que declaran que uno de sus integrantes tuvo que suspender o postergar exámenes médicos, dentales u otros, desde el inicio de la crisis


Porcentaje, hogares



Nota: Al 95% de confianza, se encuentran diferencias significativas al comparar por el sexo de la jefatura del hogar. Al comparar entre quintiles de ingreso se encuentran diferencias significativas, al 95% de confianza, entre Q1 y Q4; Q1 y Q5; Q2 y Q4; Q2 y Q5; Q3 y Q4; y Q3 y Q5. Al comparar los hogares según presencia de NNA, NO se encuentran diferencias al 95% de confianza. Al comparar los hogares según presencia de personas de 60 años o más, se encuentran diferencias al 95% de confianza.

Hogares que declaran que uno de sus integrantes tuvo que suspender, postergar o reducir otros tratamientos de salud, desde el inicio de la crisis

Porcentaje, hogares



Nota: Al 95% de confianza, se encuentran diferencias significativas al comparar por el sexo de la jefatura del hogar. Al comparar entre quintiles de ingreso se encuentran diferencias significativas, al 95% de confianza, entre Q1 y Q3; Q1 y Q4; Q1 y Q5; y Q2 y Q4; Q2 y Q5; y Q3 y Q5. Al comparar los hogares según presencia de NNA, NO se encuentran diferencias al 95% de confianza. Al comparar los hogares según presencia de personas de 60 años o más, se encuentran diferencias al 95% de confianza.




Hogares que declaran que uno de sus integrantes tuvo que reducir sus gastos en medicamentos desde el inicio de la crisis



Encuesta Social Covid-19

Porcentaje, hogares



Nota: Al 95% de confianza, se encuentran diferencias significativas al comparar por el sexo de la jefatura del hogar. Al comparar entre quintiles de ingreso NO se encuentran diferencias significativas, al 95% de confianza, entre Q2 y Q3. Al comparar los hogares según presencia de NNA, NO se encuentran diferencias al 95% de confianza. Al comparar los hogares según presencia de personas de 60 años o más, se encuentran diferencias al 95% de confianza.




Hogares que declaran que uno de sus integrantes tuvo que suspender o postergar cirugías desde el inicio de la crisis



Encuesta Social Covid-19

Porcentaje, hogares



Nota: Al 95% de confianza, NO se encuentran diferencias significativas al comparar por el sexo de la jefatura del hogar. Al comparar entre quintiles de ingreso NO se encuentran diferencias significativas, al 95% de confianza, entre Q1 y Q2; Q2 y Q3; Q3 y Q4; y Q4 y Q5. Al comparar los hogares según presencia de NNA, NO se encuentran diferencias al 95% de confianza. Al comparar los hogares según presencia de personas de 60 años o más, se encuentran diferencias al 95% de confianza.




Hogares en que al menos uno de sus integrantes ha debido reducir gastos en medicamentos, suspender o postergar su salud, desde el inicio de la crisis Covid -19



Encuesta Social Covid-19

Porcentaje, hogares



Nota: Se considera “reducir gastos en medicamentos, suspender o postergar su salud”, si los hogares declara que al menos uno de sus integrantes tuvo que: reducir gastos en medicamentos; suspender o postergar consultas médicas, dentales u otras; suspender o postergar exámenes médicos, dentales u otros; suspender o postergar cirugías; y suspender, postergar o reducir otros tratamientos de salud.

Al 95% de confianza, se encuentran diferencias significativas al comparar por el sexo de la jefatura del hogar. Al comparar entre quintiles de ingreso NO se encuentran diferencias significativas, al 95% de confianza, entre Q1 y Q2; Q1 y Q3; Q2 y Q3; y Q4 y Q5. Al comparar los hogares según presencia de NNA, NO se encuentran diferencias al 95% de confianza. Al comparar los hogares según presencia de personas de 60 años o más, se encuentran diferencias al 95% de confianza.

Fuente: Encuesta Social Covid-19, Ministerio de Desarrollo Social y Familia

Porcentaje y promedio, hogares


Indicador	Hogares que han debido reducir gastos en medicamentos, suspender o postergar su salud	Nacional
Edad promedio de la jefatura del hogar	53,1	52,1
Porcentaje de hogares con jefatura femenina	47,1 (*)	42,8
Porcentaje de hogares con jefatura sin educación media completa	33,0	30,5
Porcentaje de hogares con jefatura sin ocupación	41,3(*)	37,3
Porcentaje de hogares sin ocupados	24,3	21,3
Porcentaje de hogares que disminuyeron sus ingresos en comparación a la situación antes de la crisis de COVID-19	54,3 (*)	48,9
Porcentaje de hogares afectados constantemente	51,2 (*)	46,4
Ing. Promedio per cápita del hogar 2019	308.171	345.797
Ing. Promedio per cápita del hogar nov-dic 2020	240.166 (*)	285.450

Nota: Se considera suspender o postergar su salud, si los hogares declara que al menos uno de sus integrantes tuvo que: suspender o postergar consultas médicas, dentales u otras; suspender o postergar exámenes médicos, dentales u otros; suspender o postergar cirugías; y suspender, postergar o reducir otros tratamientos de salud. En el análisis de educación, se excluyen las categorías “Educación Especial” y “ No sabe”. Se considera los hogares como Afectados constantes si: señalan que los ingresos del hogar del último mes son menores a los que recibían antes de la pandemia y que respecto a julio 2020 son menores o se mantienen. Se consideran los ingresos promedios per cápita en pesos reales a nov-dic 2020.

Las diferencias al 95% de confianza entre los Hogares que han debido reducir gastos en medicamentos, suspender o postergar su salud con Nacional se marcan con asterisco *

Razones de suspensión o postergación de consultas médicas o tratamientos


Porcentaje, hogares que han debido suspender o postergar consultas médicas, exámenes médicos, cirugías o tratamientos



Nota: Se excluye otra razón (2,6%). Al 95% de confianza, se encuentran diferencias significativas al comparar entre todas las categorías, excepto al comparar centro de salud suspendió la hora con temor al contagio.

Hogares que suspendieron o postergaron consultas médicas o tratamientos porque el centro de salud suspendió la hora


Porcentaje, hogares que han debido suspender o postergar consultas médicas, exámenes médicos, cirugías o tratamientos



Nota: Al 95% de confianza, NO se encuentran diferencias significativas al comparar por el sexo de la jefatura del hogar. Al comparar entre quintiles de ingreso se encuentran diferencias significativas, al 95% de confianza, entre Q1 y Q3; Q1 y Q4; Q1 y Q5; Q2 y Q5; Q3 y Q5; y Q4 y Q5. Al comparar los hogares según presencia de NNA, NO se encuentran diferencias al 95% de confianza. Al comparar los hogares según presencia de personas de 60 años o más, se encuentran diferencias al 95% de confianza.


Hogares que suspendieron o postergaron consultas médicas o tratamientos por temor al contagio

Porcentaje, hogares que han debido suspender o postergar consultas médicas, exámenes médicos, cirugías o tratamientos



Nota: Al 95% de confianza, NO se encuentran diferencias significativas al comparar por el sexo de la jefatura del hogar. Al comparar entre quintiles de ingreso se encuentran diferencias significativas, al 95% de confianza, entre Q1 y Q5; y Q2 y Q5. Al comparar los hogares según presencia de NNA, NO se encuentran diferencias al 95% de confianza. Al comparar los hogares según presencia de personas de 60 años o más, NO se encuentran diferencias al 95% de confianza.

Porcentaje, hogares que han debido suspender o postergar consultas médicas, exámenes médicos, cirugías o tratamientos



Nota: Al 95% de confianza, NO se encuentran diferencias significativas al comparar por el sexo de la jefatura del hogar. Al comparar entre quintiles de ingreso se encuentran diferencias significativas, al 95% de confianza, entre Q1 y Q5; Q2 y Q5; Q3y Q5; y Q4 y Q5. Al comparar los hogares según presencia de NNA, se encuentran diferencias al 95% de confianza. Al comparar los hogares según presencia de personas de 60 años o más, NO se encuentran diferencias al 95% de confianza.



Encuesta
Social
Covid-19

2. Salud mental durante la pandemia

Dentro de la encuesta se incluyó una batería de 4 preguntas relacionadas a detección de síntomas de ansiedad y depresión (Kroenke et al, 2009).

Se pregunta al informante la persistencia de 4 molestias en las últimas 2 semanas donde cada pregunta tiene un puntaje de 0 (Para nada) a 3 puntos (Casi todos los días). Las preguntas son las siguientes:

1. Poco interés o placer en hacer cosas.
2. Se ha sentido decaído(a), deprimido(a) o sin esperanzas.
3. Se ha sentido nervioso(a), ansioso(a) o con los nervios de punta.
4. No ha sido capaz de parar o controlar su preocupación.


De la batería de preguntas se pueden desprender 3 indicadores:

1. Las primeras 2 preguntas son en torno a situaciones relacionadas a síntomas de depresión y se pueden agrupar en un puntaje agregado (0 a 6) donde los individuos que obtienen puntaje de 3 o más implica que presenta síntomas de depresión (***Subescala de depresión***).
2. Las últimas 2 preguntas son en torno a situaciones relacionadas a síntomas de ansiedad y se pueden agrupar en un puntaje agregado (0 a 6) donde los individuos que obtienen puntaje de 3 o más implica que presenta síntomas de ansiedad (***Subescala de ansiedad***).
3. Las 4 preguntas se pueden agrupar en un indicador (de puntaje de 0 a 12) que indica el nivel de síntomas de ansiedad y/o depresión de la persona (***Indicador PHQ-4***), en las siguientes categorías:
 - Puntaje de 0 a 2: No presenta síntomas de ansiedad y/o depresión
 - Puntaje de 3 a 5: Presenta síntomas leves de ansiedad y/o depresión
 - Puntaje de 6 a 8: Presenta síntomas moderados de ansiedad y/o depresión
 - Puntaje de 9 a 12: Presenta síntomas severos de ansiedad y/o depresión

Los análisis que se presentan a continuación comparan los resultados expandidos obtenidos para la población de 18 o más en torno a las preguntas de salud mental.

Indicador PHQ-4: Porcentaje de personas de 18 años o más según síntomas de ansiedad y/o depresión

Porcentaje, población de 18 años o más




Nota: Diferencia entre categorías para cada grupo: Al 95% de confianza, NO se encuentran diferencias significativas al comparar entre la intensidad de los síntomas para i) Nacional: síntomas moderados con severos; ii) Hombre: síntomas moderados con severos; y iii) Mujer: No presentan síntomas con síntomas leves.

Diferencia entre grupo (Hombre-Mujer): Se encuentran diferencias significativas, al 95% de confianza al comparar por sexo la intensidad de síntomas de depresión y/o ansiedad. Se incluye información exclusivamente para aquellas personas que contestaron la segunda ronda de la Encuesta Social Covid-19.

Indicador PHQ-4: Porcentaje de personas de 18 años o más que presentan síntomas moderados o severos de ansiedad y/o depresión


Porcentaje, población de 18 años o más



Al 95% de confianza, NO se encuentran diferencias significativas a nivel nacional al comparar entre los periodos. Se encuentran diferencias significativas al 95% de confianza en la variable sexo al comparar hombre y mujer tanto para el periodo julio 2020 como para noviembre-diciembre 2020

Indicador PHQ-4: Porcentaje de personas de 18 años o más que presentan síntomas moderados o severos de ansiedad y/o depresión


Porcentaje, población de 18 años o más



Nota: Al comparar entre quintiles de ingreso se encuentran diferencias significativas, al 95% de confianza, entre Q1 y Q4; Q1 y Q5; Q2 y Q5; y Q3 y Q5. Al comparar por tramo de edad, NO se encuentran diferencias al 95% de confianza.

Porcentaje de personas de 18 años o más que presentan síntomas moderados o severos de ansiedad y/o depresión, por nivel de endeudamiento de los hogares, y si han debido suspender o postergar su salud

Porcentaje, población de 18 años o más




Nota: Se considera suspender o postergar su salud, si los hogares declara que al menos uno de sus integrantes tuvo que: reducir gastos en medicamentos; suspender o postergar consultas médicas, dentales u otras; suspender o postergar exámenes médicos, dentales u otros; suspender o postergar cirugías; y suspender, postergar o reducir otros tratamientos de salud.

NO se encuentran diferencias significativas, al 95% de confianza, al comparar por el nivel de endeudamiento para: i) No hay deudas con hay deudas y se pagan a tiempo; y ii) Hay deudas y algunas se pagan con hay deudas y ninguna se paga.

Al comprar entre los hogares según han debido suspender o postergar su salud, se encuentran diferencias significativas al 95% de confianza.

Porcentaje de personas de 18 años o más que presentan síntomas moderados o severos de ansiedad y/o depresión, comparación entre periodos


Porcentaje, población de 18 años o más



Nota: Categoría No disminuyó es un conjunto de las opciones: Se mantuvo igual o aumentó. Al 95% de confianza, NO se encuentran diferencias significativas al comparar entre los periodos según la variación de ingresos del hogar, en comparación a la situación antes de la crisis de COVID-19. Al 95% de confianza, se encuentran diferencias significativas al comparar entre la variación de ingresos del hogar para nov-dic 2020.

Porcentaje de personas de 18 años o más que presentan síntomas moderados o severos de ansiedad y/o depresión, según situación experimentada en los hogares con presencia de personas de 6 a 18 años

Porcentaje, población de 18 años o más que viven en hogares con presencia de personas de 6 a 18 años



Nota: Al 95% de confianza, se encuentran diferencias significativas al comparar entre la dificultad en el apoyo en las actividades educacionales que experimenta el hogar.

Aumentar ingresos


- Vender bienes como por ejemplo un auto, electrodomésticos, muebles, etc.
- Usar ahorros del hogar.
- Pedir un préstamo o crédito a un banco u otra entidad financiera
- Retirar el 10% de la AFP
- Pedir dinero prestado a familiares, amigos o vecinos
- Pedir dinero a prestamistas informales
- Retirar dinero de una tarjeta de crédito o de casa comercial, o usar una línea de crédito
- Poner en arriendo propiedades, terrenos, habitaciones, herramientas de trabajo, etc.
- Vender propiedades, terrenos, habitaciones, herramientas de trabajo, etc.
- Pedir un adelanto de sueldo o pago
- Realizar otros trabajos ocasionales como, por ejemplo, pololos, pitutos, etc.
- Otro

Reducir gastos

- Reducir gastos en educación
- Reducir gastos en salud, incluidos salud mental y dental
- Reducir gastos en alimentación
- No pagar teléfono, internet u otro servicio de comunicación
- Reducir los gastos o dejar de pagar calefacción, parafina, leña
- No pagar arriendo
- Pagar menos arriendo
- No pagar el dividendo
- Renegociar el dividendo
- No pagar gastos comunes
- No pagar otras deudas
- Renegociar otras deudas
- Cambiarse de casa o departamento.
- Otro

Porcentaje de personas de 18 años o más que presentan síntomas moderados o severos de ansiedad y/o depresión, según el número de estrategias realizadas por el hogar para reducir gastos y aumentar ingresos

Porcentaje, población de 18 años o más



Nota: Al 95% de confianza, se encuentran diferencias significativas al comparar entre los hogares según el número de estrategias realizadas tanto para reducir gastos como aumentar ingresos. Las estimaciones relacionadas a las categorías 8 y más estrategias son consideradas estimaciones no fiables.



Características de los hogares de personas de 18 años o más



Porcentaje y promedio, población de 18 años o más

Indicador	No presenta síntomas o leves de ansiedad y/o depresión	Síntomas moderados o severos de ansiedad y/o depresión
Edad promedio de la jefatura del hogar	52,5	52,7
Porcentaje de hogares con jefatura femenina	36,6	46,0 (*)
Porcentaje de hogares con jefatura sin educación media completa	29,1	33,2
Porcentaje de hogares con jefatura sin ocupación	34,2	44,5 (*)
Porcentaje de hogares con presencia de NNA	45,3	44,0
Porcentaje de hogares con presencia de personas de 60 años o más	43,6	46,2
Porcentaje de hogares sin ocupados	18,0	25,1 (*)
Porcentaje de hogares que disminuyeron sus ingresos en comparación a la situación antes de la crisis de COVID-19	44,9	61,5 (*)
Porcentaje de hogares afectados constantemente	42,3	57,7(*)
Ing. Promedio per cápita del hogar 2019	349.601	273.788 (*)
Ing. Promedio per cápita del hogar nov-dic 2020	282.511	225.778

Nota: Se consideran los ingresos promedios per cápita en pesos reales a nov-dic 2020. Las diferencias al 95% de confianza entre la población de 18 años o más que no presenta síntomas o leves de ansiedad y/o depresión con los que si presentan síntomas moderados o severos de ansiedad y/o depresión se marcan con asterisco *. En el análisis de educación, se excluyen las categorías "Educación Especial" y " No sabe". Se considera los hogares como Afectados constantes si: señalan que los ingresos del hogar del último mes son menores a los que recibían antes de la pandemia y que respecto a julio 2020 son menores o se mantienen.

Fuente: Encuesta Social Covid-19, Ministerio de Desarrollo Social y Familia



Encuesta
Social
Covid-19



Resultados:
Educación: personas 6 a 18 años.

2da Ronda ESC-19